

**DE HEMERALOPIA
ET NYCTALOPIA
DISSERTATIO
INAUGURALIS
QUAM ... UNA...**

Pietro Cassa



35
Sub

DE
HEMERALOPIA ET NYCTALOPIA

Dissertatio Inauguralis

QUAM

CONSENSU ET AUCTORITATE

PERILLUST. DIRECTORIS AC PRÆSIDENTIS FACULT. MEDICÆ,

FRIDERICUS D. DECAE,

REG. FOR CLASSEMORUM D. D. PROFESSORUM

UT DOCTORIS MEDICINÆ LAUREAM CONSEQUATUR

IN Q. R. UNIVERSITATE VINDOBONENSI

ADOPCIT

D.^{no} FRANCISCO FLARER

MD Ocularius P. O.

UNA CUM VIRIDIBUS REPERIMENTIS

publicæ Disquisitioni offertur

CASSA PETRUS

EX STIRIA.



TICINI REGII

Et Typographia Sigoni

1847.



Parvulus

1. $\frac{1}{2}$ of the total

10

10

10

10

10

10

DE HEMERALOPIA ET NYCTALOPIA.

— 0 —

PRÆLOQUIUM.

Quo nobiliterem organon aliquod functionem exerceat, et complicatiorum reſerri fabricam, eo facilius aegrotare, ac difficilius negotio ad ſanitatem reſtitui, nil melius comprobatur quam ab Oculo, qui ſenſum præſtantiffimo dicato, multiplicibusque partibus inſtructo rita non innumera, curata accepiſſe ſæpe difficillima, morbis teſtatur.

Inter morboſas autem, quibus oculus affligitur, adſectioſas, ob phænomenon ſingularitatem, obque circumſtantiarum ſub quibus e-

valentur, diversitatem, non minus ac propter
essentiam, sive pathologicas condiciones obscu-
ritatem, non ultimam Medicorum attentionem
perfecto merentur, opposita duæ visionis vi-
tiæ, quæ *Hemeralopia* siquæ *Nyctalopia* no-
minibus passim à Pathologia solentur.

Inauguralem itaque disceptationem conscrip-
turus, inter diversa, quæ mente occurrant,
medicinas argumenta, hoc prout ceteris am-
plexi nati, ducti fretus apæ hemeralopias et
nyctalopias symptomata et causas, licet bre-
viter adumbrando, medicorumque attentionem
in hujusmodi vitii aberrationem revocando,
sufficienter quod mihi incumbit academicum
munus me expleturum fore. Opus hinc jam
pari aggredior, de hemeralopia primum, po-
sterius de nyctalopia, prout meae ferent vi-
res, edisserens.

CAPUT PRIMUM.

DE HEMERALOPIA.§. I. *Morbi definitio et symptomatologia.*

Haec oculorum affectio, quae fit ut hoc organum objectus sub languido crepuscularum lumine, nocturnoque tempore distinguendis impar evadat, dum a converso recte ea videt quaeque vel horizontem tenet *Hemeralopia* nomine apud Pathologos vocit, a graecis vocibus *epos* dies et *crepus* videtur.

Pluribus apud Medicinae scriptores nominibus insignita invenitur hujusmodi oculorum affectio, et hinc passim vocitur nocturna, coecitas crepuscularis, *dyopia tenebrarum* nuncupatur. *Plum* dicitur a celeberrimo Boerhaave dicta fuit, et *amblyopia crepuscularis* a Sauvagesio perillustris Scarpa opinionem praesentem, qui cum imperfectam amaurosin hunc affectum habuit.

Antequam vero ulterius progrediamur silendo hic praetereundum non est, quod apud veteres praesertim, sed etiam apud nonnullas

G

inter nocturnos hoc visum vitium cum oppo-
sito confunditur, et nocturna visio hemicla-
psia vocabulo intelligitur vocis æthymon ab
επεα δει, *ε*, particula negationem indicans,
αει, *αδ*, et *ω*; oculum derivando, quasi ocu-
lum suum privationem significare vellet. Hoc
autem perperam factum est, nam quem tradi-
ditur morbi definitio vocis æthymologice ma-
gis rectiusque respondet.

Hemiclipsis modo de repente ingruit sub-
itis aliis morbois phænomenis præsentibus,
sive paulatim evolvitur, sæpe a variis gene-
ris incommodis præceditur.

Tali ratione qui hemiclipsis latari sunt per
plus minusve longum temporis intervallum ca-
pillis dolorem frontem et supercilia præer-
tim occupantem experientur, qui non conti-
nuus esse solet, sed ad vires redire atque
evanescere. Morositas deinde supervenit cum
vitiis deiectione appetitusque dejectione.
Os fit plerique valde anarum, lingua alba
vel flavo crassiorique mucus obducitur; nausea
vomitusque comites præsto sunt. Plurima he-
miclipsis præceduntis vagis membrorum
dolores aut torpores, die ut plurimum consi-
stentes ut nocte pernoctanti fiant, auctor est
celeberrimus Boyer, qui exemplum hominis in
Hospitio Christiani accepti in medium proferit.

cui per decem ebdomadarum spatium antequam hemeralopia corripiretur, immensus dolor cum maximo corporis sensu, die ardens, et quavis nocte rediens, sinistram brachium torquebat. Interim (praecedens nec ne haec symptomata mox exposita) visus paulatim labefactatur, et imminuitur, tali quidem ratione ut matutinis et vespertinis temporibus, resque magis nocte objecta nisi ad oculum valdeperae adpropinquarent, non amplius recte distinguerentur. Gradatimque increvit hoc visus defectus usque dum perfecta hemeralopia sit evoluta; quod interdum effusione, nonnumquam post longius temporis intervallum succedit. Tunc seger nonnisi ex tempore videt quo sol horizontem petit, nocte, circa vespere, et matutina hora perfecte obsecratus. Neque putandum est quod hic visus defectus ab aliquo partium oculi constitutionis vicio dependeat; oculi enim sanorum ad lustrum acriorior, nullam neque in liquidis, neque in solidis abnormitatem praefertentes, ac pupillam exsipias quae utplurimum magis dilatata quam de nocte adstricta. Pupilla autem ipsa motibus plerumque est quavis lentius proprias oscillationes peragat, nocturno praesertim tempore, candelat licet lumine appropinquato. Et nunc quoque saepe et plerumque molestus quibus capitis dolor cum ponderis

sensu, temperascente potissimum die, neque deciduenter aliquando vertigines, praesertim si caput ad inferius vertatur, et lesionis cerebrialis congestionis indicia, et gastrorum acrium notae.

Angi itaque circa meridiem horumque hinc proximius perfecte vident, nec aliquam in oculis morbosam sensationem experiantur. Advenientibus autem crepusculis visus paulatim immutatur, donec nocte ex integro extinguitur, quasi perfecta amantoris in praesentia sit, adeo ut nec proximiora corpora neque ipsa haec interdum distinguantur. Mirabile huiusmodi exemplum ex auctoritate Boerhaavi, refert praestantissimus Sauvagesius de juveni Britanno = qui optime interdiu videbat, quando sol erat supra horizontem; aut ad eum = occiduum nebulae per se oculis videbat; post = occiduum nihil omnino videbat, ne quidem = in cubiculo candela copiosis illuminata, nec = ad lumen huius uterunque splendulae, ad = quod pupilla erat immobilis (1) = Tobacconis quoque Laserre analogam historiam memorat puellae Mompeludi degentis quae dum die optime videret nocte fruebatur nec lumen oculis vix non eductum nocte cernebat (2).

(1) *Nou. method. T. I. p. 384.*

(2) *Epheva. Cur. Nat. dec. 2. an. 6. obs. 78.*

Ad phenomenon, quod prae ceteris curiosum habetur in hoc morbo, illud profecto est quod hemerolopi optime in die vident, licet solis lux valde debilis sit propter coelam obscuratam, dum e converso nil percipiunt nocturno tempore nec majori quidem luce opitulante. Hoc jam adnotaverat inter alios praedilectissimus Boyer hinc verbis: « Una « cosa molto singolare » è che gli Emmerolopi « vedono distintamente ad una luce oscura, « quando il sole è sull'orizzonte, mentre do- « po il tramontare di quest'astro, comunque « viva sia ancora la luce che sponde, essi « non vedono gli oggetti che molto confusa- « mente (1). » Hocque confirmat perillustis Reijz Delorme, qui tali modo se exprimit: « Ricono poi cosa singolare nell'affezione, che « se occupa, il fatto, che i malati veggono « benissimo quanto ogni altra persona, an- « chechè s'ite s'abbia velato il sole, e rendano « oscurissimo il giorno, e che cessano di di- « stinguere gli oggetti allorchando quest'astro « sparisce dall'orizzonte, sebbene tal'oggetti « siano peranco rischiarati dalla riflessione « della luce sparsa nell'atmosfera. E quindi « l'emmerolope distingue il momento in cui il

• (1) *Ann. Chir. T. 3. p. 212.*

102

« Sole si alza sul nostro orizzonte, e quello
 « in cui esso ne parte ne' tempi nebulosi, che
 « rendono siffatto passaggio impercettibile pel
 « restante degli uomini (1). »

§. II. *Anthologia et Causa Proxima.*

Hic exponenda, non temporaria causas,
 quae huic affectui gignendo sunt parae, tra-
 dere oportet, relate ad quas multum adhuc
 haberi obsecritatum fateri necesse est. Quae
 gracilem corporis constitutione sunt praediti,
 qui alimentis crassis, viscidis, glutinosis utun-
 tur, qui diuturniori somno indulgent, saepe-
 temque idcirco vitare ducunt, in hoc pathema
 proclives sunt communis fere medicorum sen-
 tentiae. In eandem rem attentionem facilius
 offendere qui largiori liquorum alcoholicorum,
 potuumque cujuscunque generis calefacientium
 usu nimis parent, praecaudatus Beyer ce-
 citur est, qui pariter saepe ascripsit a natura-
 bus aut artificialibus habituum evocatio-
 num suppressionis interdum procedere decess.
 Neque minus eidem morbi obnoxii videntur,
 qui aliquae ventriculi irritatione laborant, vel
 aliquam in apparatu bilifero alterationem pa-

(1) *De. Clin. et med. int. ed. lat. V. 10.*
 p. 237.

stant. Quaecumque porro causae remota validiori stimulo excitare valent, quomodo-
cumque enim interiore lux oculis diutius adnotata
hemeralopiam utpote connectentem habere pos-
sunt. Neque minorem symbolam conferre for-
tatur ad hujusmodi morbi evolutionem facilius con-
sulamus, ceterisque aliis. In pellagra detentis
haud raro hemeralopiam occurrere ex Beau-
sille observationibus constat. Haereditaria tan-
tum dispositione aliquando propagari tunc
acontilli; ac hoc pessimo contingere influere
aequit; et formam unam saluberrimo exemplum
hujusmodi extaret in *Epithemidibus Natanae*
Caricorum expositum, nisi superius historiam
enunciaret. Ceteri familiae ejusdem in qua e
ducentis jam annis haereditarias hic morbus
observatur.

Verum, quae in hemeralopia producenda
superem ubi vindicet aptam, causae in tem-
pestate humido-frigida, omnibus tentantibus
auctoribus, procul dubio reponenda venit.
Ex inde profuit ut verum et autumali tem-
pere crebrius ipse observetur; aliunde fit ut
nonnullis locis endemice grausetur, quomodo-
cumque, Patre d'Estrecolles referente, in China
ab nimis diffusam cryxae antiquae culturae
contingit; aliunde evenit ut saepenumero epi-
demiarum ad instar afflictionum plures an-

pesomero uno tempore adgrediat. Epidemicam Nonspellii hemerolopiam observavit Sauvageus milites praetectoris offendens sub die in aere humido et nebuloso cucubias agentes; epidemicam, et eadem causa, observavit Chambersu in rurebus Saint Martin, Follajaville ubi vigintiannu in altero, in altero decimum incolaru partem adfectavit. Ex eo quod vaporibus paludosis exposita est quaedam Parisiis educationis domus evenit ut quotis anno hemerolopia in ipas advertatur; quid quod in hospitio Berolici a quinq; jam annis obtinere tradit clarissimus Dupont.

Quae quum ita siet, non immerito, prima rerum facie, egius videntur illi, qui unicam hemerolopiae causam frigida-humidam sistere statuerunt. Conclia vero rite perpendis circumstantia, quae huiusmodi morbi evolutioni favent, hoc longe a veritate abhorrere, recte admonet protestantissimus Baige — Delermus; qui ita ait. « la ante di tutti questi fatti ten-
« denti a provare la influenza del freddo e
« della umidità sulle sviluppo della emeralo-
« pia, posso credere sieti peranco qualche al-
« tra influenza poco valutata, imperocchè ci
« esponiamo specialmente a queste cause senza
« che producano il morbo attribuito alla loro
« azione..... Il freddo e la umidità insieme so-

« no cause comunissima, ma la emeralopia
« non si osserva tanto di frequenza » (1).

Non minore ac in 'procatartica hemeralopias causas determinanda in illius natura sive causa proxima statuenda difficultatem invenimus. Sauvagesius a superflua veri quantitate in sanguine massa redundante, oculoque, quorum vasa relaxabat, petente, morbum repetente. Vetuslaris veri medici lymphas opacitadinem naturali majorem utpote ejusdem causam crivinsbantur. Nonnulli peculiarem dantant oculi hemerum dispositionem, qua sic ut alii calore opulente rarefiant et pellucidit evadant, dum sub noctis frigore, densantur opacanturque. Democri hujace adfectionis causam in cerebro collocat, causaeque dyslopias similiter declarat. Maxima vero neotericorum pars ab imminuta retinae sensibilitate pendere praecipiant. Quae quidem retinae insensibilitas vix non semper in hemeralopia in praesens esse admonet praestantissimus Boyer, est ad phaenomena ipsam concomitantia rite explicanda non sufficiens pariter contendit. « Quindi, inquit ille, allorchè si vedono degli « emeralopi assolutamente insensibili alla luce « artificiale comunque viva che sia, si è obbli-

(1) *De. Clin. T. cit. p. 268.*

14

«già di ammettere in essi qualche cosa di più
« che una semplice diminuzione nella sensibilità
« della membrana nervosa dell'occhio»(1).

§. III. Prognosis.

Nell'era mortis periculum ex hoc morbo imminere docet Sauvagesius, probatque secularis experientia, magisque terrore quam notum esse præcipit Democritus. Diutius tamen perire solet, et perire ante mensis annus alternare spatium evanescit. Sæpe tamen per tres quatuorve menses aegrum affligit; nonnunquam per sex vel octo, Longioris durationis exempla, si Bayre fides est habenda, cumque desiderantur. Sanatur vero et cibi relicta; cibus autem apte ratione curata. Sed eadem, quæ profligatur, facilitas, iterum iterumque redit, et quamplurima observationibus evictum est qui olim eam sunt passi per plures deinde annos consecutivos in illam offendere.

(1) *Iust. chor. t. III. p. 161.*

§. IV. Curatio.

Rationalem homœopathiæ curatiōnem instituentibus causas quæ eam producere omnium primò tollere oportebit, et affectus in posterum oppugnare. Quotiescunque congestio ad cerebrum vel universalem plethoræ notas in conspectu habeantur, venæsectio cito celebranda est, et deinde hyndines retro aures aut ad vasa hæmorrhoidalis admoveantur vel cucurbitas ad necem profundius incidendas. Deinde quem morbus vix non semper sordes gastricæ comitantur remedia emetica et purgantia propinare coufert, ex quibus respos maxime sæpe sæpius appetitus haberi consuevit. Præstat porro vesicatorium nuchæ imponere, et diversarum substantiarum ad oculos dirigere. Aromaticas fumigationes optimas præfendit Dupont effectus præbent. Boyer non oblique aegrorum amuletis alcoholicis vapores vel ex ammoniæ carbonicæ, vel et ipse ex infusionibus cum herbis floribusque aromaticis coactis ad oculos dirigebat. Scarpæ suffumens laudat ex spiritu volu ammoniacæ caustice. Lotiones præterea cum aquavilæ et urina asine invenit Poulson, cui protoschlorureto hydrargyri administratio quo-

que accitit. Ubi haec medicorum ratio non respondet, quaedam, utpote utilima, a Baige-Delectue proponitur methodus, quae salutaris, quoniam exurit effectus, actioni, quasi dicam re-vellenti, quem in tubo gastro-enterico exerceat, procul dubio debet, etque in hoc utilis, ut prima die duo vel tria tartari emetici grana propinquantur; deinde sudorificum ex propoco, saussfras, cina, et salaperilla paratum decoctum subministratur; aliter adhuc die vesicatoria nasci et retro aures admoventur. In prima ebdomada altera quavis die emesis excitanda; in posterum alternis diebus purgans, aut emeticum, aut emetico-entericum vel per-rigendum quotiesque boni sint consecuti effectus. Tunc si analis ex integro non fuerit obstita, adultis octo vel decem, pueris lixas vel tres pilulas suppedicare necesse erit ex decima proto-tartratis antimoni et potassae grani parte, et pulveris radicis pilaeae aut scammonii grana duobus vel tribus confectas. Quae curatio methodo citius quam cum ceteris aliis emetico aequatur.

Hiis addenda est corticem peruvianam et valerianam sylvestrem una quoque sibi haec in hemeralopis curatione praescribere.

Quid autem dicendum sit de circumferen-tiae corneae cauterizatione a Boeyville supe-

rius proposita, cujus ops in triem vel quatuor dierum spatio quatuor in casibus sanationem obtinuisse testatur (1). Nos lectoribus de hoc auxilio iudicium libenter relinquimus.

Antequam vero auxiliorum in hemeralopia praestandorum expositioni finem imponamus de vulgari quidem ac antiquissimo tentamine loquendum est, de fumigatione, nimirum, ex hepate bovis coacto. Nullum aliud sublidum celebritate hoc antecedit, a quo non abhorruit ipse celeberrimus Scarpa, qui quatuor in casibus optime cum successu illud adhibuisse tradit (2). Doctor quoque Vivarelli ter maximo cum sanctorum emolumento ipso usum fuisse testatur (3). In Ticinensi Clinica Ocularia quoties pericula instituta ferre cum sola hepatis cocti evaporatione et successiva doli hepatis consumptione, illam ut jam a Celso commendabatur psaltria comedendo. Sed qui praeter omnibus efficacissimam ejusdem virtutem comprobavit, fuit jam supra laudatus Dupont, qui rebus ad illud sequentia exponit: « Ce fut un vieux soldat qui indiqua à ses camarades le remède que je vai d'écrire... Les soldats font

(1) *Journ. de med. de Bordeaux.*

(2) *Scelte principali med. degli occhi* p. 323.

(3) *Annal. de med. chir. e farm. sperimentale* e *legale* 1835 p. 19.

18

« cuire une tranche de foie de bœuf, pesant
 « environ une demi-livre, dans un pot de terre
 « neuf vernissé, et de grandeur telle qu'il
 « soit complètement rempli par quatre livres
 « d'eau. Lorsque le foie est cuit, comme pour
 « le manger, et que la vapeur est d'une cha-
 « leur supportable, il portent le pot sur leur
 « lit, et inclinant la tête de très-près, ils se
 « font jeter une couverture par dessus eux,
 « de manière à y être exactement enfermés
 « avec le pot. Ils y restent jusqu'à ce que le
 « bouillon ne produise plus de vapeur, ou que
 « le gêne de la respiration les oblige de sor-
 « tir. En général, une seule application suffit
 « pour les guérir radicalement. J'ai connu des
 « soldats enrhumés qui n'avoient voulu rien faire
 « pendant trois semaines; je l'ai même quel-
 « quefois essayé, afin de savoir si le remède
 « seroit aussi efficace pour une maladie ancien-
 « ne que pour une récente. Je n'y ai pu ob-
 « tenir de différence, et à présent que je crois
 « avoir fait toutes les expériences nécessaires à
 « ma conviction, je fais administrer de force
 « le même traitement de leur maladie, lorsque
 « je puis en avoir connaissance. Je ne dési-
 « gnerai point les noms de ceux qui ont été
 « guéris de cette manière. Il existe actuelle-
 « ment au régiment plus de deux cent cin-

= quante hommes traités de cette manière, et
 = notamment plus de soixante à la fin de mars
 = et dans les premiers jours d'avril dernier
 = 1787 = (1).

Tam verum est quod simpliciora auxilia
 therapeutica maxime nonnunquam victuta
 pallent.

Alie etiam cum methodo Bampfildii in vi-
 ciniori instituto oculorum instituta fuere peri-
 cula, et toties aegri solo emplastro vasicaterii
 usi; quod max ad tempus, retro auris, ad
 regionem supradictam adhibebatur, perfecta
 restituti fuerunt. Hemorologia magnum juxta
 opinionem nostri Anaplex cum rheumatismo,
 et febribus intermittens habet analogiam,
 et si decocto aliptum dulcamaras, arcano du-
 plicato et extracto acanthi et paucis dosi tur-
 tari subtili commixto, quod specificum fore
 videtur habere virtutem cedere non vult he-
 morologia etiam inveterata, ad methodum
 Bampfildii recurrendum esse censet.

(1) *Bouvel périod. de la Soc. de Med. de Paris* an. 3 c. 2 p. 82.

CAPUT ALTERUM

DE NYCTALOPIA.

§ 1. *Definitio et Hypothesis.*

Oppositam hemeralopie visuale vitium, in quo, videlicet, acri diurno tempore nec propinquiora cernunt objecta, dum nocte perfecte vident *Nyctalopia* (a graecis vocibus *nyx*, *nô* et *topos* *videre*) consistit, quae a nonnullis *cecitas diurna*, ab aliis *dyssopia diurna*, a Sauvageo *amblyopia meridiana*, a Pletro *superba acris*, a Boerhaavo *visus nocturnus*, a Gallo *Nyctalopia*, *P'ne de l'ibon*, *de chat* etc. ab aliis aliis nominibus nuncupatur.

Rondeletius cum veterum quamplicibus cum hemeralopia hanc morbum commutavit inquam: "*Nyctalope* est nocturna cecitas, "*que detenti valeat interdū, nocte nihil aut* "*parum* "; quod de hemeralopia jam evincit superior tradidimus.

In primariam seu essentialem aut idiopathicam, et secundariam vel symptomaticam

nyctalopiam scindere maxime confert. Posterior in cataracta et perfusi corneae opacitate observatur, atque ex eo pendet quod sub vividioribus lucis actione pupilla coarctatur, ideoque radiorum in retinam impressioni obstat, dum e contrario minori vi luce oculum feriente, dilatatur pupilla et magis radius laesibilis ita coarctat. Prior autem sive idiopathica, quae citius a nulla organica alteratione procedit, pararo occurrunt, et retinae hyperaesthesiae aut alioquin internae oculi partis inflammationis significat. Quod si, quemadmodum nonnullorum auctorum fert mens pro nyctalopia illa tantam oculorum affectionem habenda sit in qua aegri solis, densioribus licet nubibus obiecti, lucem minime ferunt, artificiale atque e contra vel vividiorum lucem, nocte absque molestia substinent, magis infrequentem adhuc affectionem autis, utriusque formae tantum rite observatum exemplum in Ephemeridibus Naturae Curiosorum extat patellae quatuor totos aestas, quae a huius jam annis autumnali tempestate fluxionem ad oculos pertinebat cum maxime in die lucis intolerantia dum nocte ex ignis et candelae luce nullum incommodum experiretur. Qui itaque hoc affectu laborant palpebras interdum emectas, densiorisque velamine coguntur, sive

secus magnas patienter molestias, nec circumstantia objecta videre queant, nec oculorum explorationem ferre queant. Lucis autem impetio adstante injectionem, profundamque lacrymationem producit. Cephalalgia saepe comitem se facit. Nocte autem adpropinquante paulatim haec phaenomena evanescent, neque tum objecta circumposita videre, tum artificialia lucis actionem ferre queant.

Datur ne epidemica nyctalopia? In secunda Hippocratis epidemiarum libro hoc admittitur; dubium autem est utrum Medicinæ Patens nam hemeralopia nyctalopiam minime confunderet.

Idem repetere deest de hereditaria nyctalopia quam in Iosephi Scalligeri gente observata fuisse fertur.

§. II. *Causae remotae et proximae.*

Inter remotas nyctalopiae causas esse omnes recensentur, quae majorem partem oculi componentium sensibilitatem, aut earundem inflammationem producere queant. Sic interdum a vigilia nimis protracta, a studiis profundioribus, a gravioribus laboribus procedit, alias liquorum spirituosorum abusus effectum sistit. Ex ebrietate hominem nyctalo-

plia correptum vidit Willisius. Aliquando a le-
cis demetidine emendatur, quemadmodum in
Anglo contingit, qui post quam obacuro in
carcere reclusus fuerit per mensis spatium
nullam objectam crederet; hoc vero trans-
acto vel minata aliis invisibilia objecta pen-
satum videre coepit; denique libertas lucem
ferre nesciebat et perfecte nyctalops erat.
Nemumquam febris adynamica, vel atonica,
hysterica, hypochondriaci, helminthiaci ut-
pote symptomata comites se faciunt nyctalopia.
Plerumque vero secundaria est; et varias co-
mittitur oculorum affectiones. In cataractae ex-
cessu quidam advertitur, ex circumstantiis
supra expositis, nyctalopiae gradus. In variis
ophthalmiarum speciebus, si altiorum phlego-
sis attingat gradum, solennius, ob nimiam oca-
li sensibilitatem, est comae nyctalopia, cujus
in causa esse equidem potest cerebri vel me-
ningum irritatio aut phlegosis et similia.

Quam symptomatice plerumque, de qua
loquimur affectio sit, in morbum qui eam
producit therapia dirigenda est. Hinc si oph-
thalmia, aut meningum cerebri inflammatio
aut congestio, aliaque similia ejusdem in cau-
sa sint, vana speranda est, et remedia pur-
gantia, emetica, et cujuscunque generis anti-
phlogistica suppeditanda sunt. Vesicantis ne-

ose adplicita vel corruptitas hic incidat alijs proferre, alijs iterum purgantia, necesseque scientia. Pilulas ex communiori et sola gemmas drachma dimidia, et castorei scrupulo confectas laudat Aëtius. Masticatoria ex pithero, cubebis et seminibus forniculi imperanda esse praecepit Rondeletius, qui certius minus convenientia declarat, atque faciem oculis excipendum esse admolet ex sequentibus substantiis obtentum.

R. Chelidon.

Rutae ana Man. +

Summit. fornic. — j.

Semin. scab.

Foenogr. ana unc. j.

Decoa. in aq. et vin. et succo recipiatur.

Antiqui porro fere omnes commendaverunt jecur hircinum, nullis media praeparatum, et cum sale comestum.

Denique Prof. Martini methodum a Vassal exhibitam hinc verbis exponit: «Il D. Vassal guarì una nittologia con questo semplicissimo metodo: fece preparare due coni « di cartone, lunghi due pollici e mezzo, « veri internamente, all'estremità di ciascuno « come mise un vetro azzurro: applicò l'altro tra estremità e ciascuna palpebra in modo « che i margini del cono penetrassero nell'or-

= bina; applicò una cortina di taffetà nero alla
 = periferia di questa estremità talchè i raggi
 = luminosi non poterano penetrare (1) ».

FINIS.

(1) *Ann. di Med. Chic. e Farm. Marzo e
 Apr. 1832. p. 122.*

Theses defendendae.

1. *Pellagrum novum morbum non sibi.*
2. *Palmarum haemiplegia non semper a phlogi-
gon repetenda.*
3. *Paracanthas in typhoide intestinali nun-
quam habenda.*
4. *Falculum typhoide degeneratio.*
5. *Contagium typhicum irritantē sibi potius.*
6. *Scabiei morborum crisi nunquam consti-
tuere.*
7. *Purgantia irritantem potius quam contracti-
culantem actionem semper exercere.*